

Het onderzoek

Hoe uw onderzoek in zijn werk gaat.

Bloedprikken

Video voice-over

U komt binnen in de prikruimte en neemt plaats op een stoel. Een medewerker zal u vragen uw arm te ontbloten. Daarna wordt er een stuwband om uw bovenarm aangebracht. Deze band voelt strak aan. Een deel van uw arm wordt schoongemaakt met een vochtig gaasje en de verpleegkundige zoekt een bloedvat. Daarna wordt de naald in het bloedvat geprikt, dit doet even zeer. Afhankelijk van uw situatie worden er één of meerdere buisjes bloed afgenomen voor verder onderzoek. Als er genoeg bloed is afgenomen, wordt de stuwband los gemaakt en zal de medewerker de naald uit uw arm halen. Het kleine wondje wordt met een pleister verzorgd. Dit doet geen pijn. Gewoonlijk duurt het onderzoek zo'n 2 minuten.

Bloedprikken is het afnemen van bloed uit een bloedvat door middel van een prik met een holle naald.



Geboortedatum ter controle

Er kan ter controle naar uw geboortedatum worden gevraagd.

Uw voorbereiding

Bereid u voor en houd u aan de onderstaande instructies.

Nuchter zijn in bijzondere gevallen



In sommige gevallen mag u niets eten of drinken voor de bloedafname. Bespreek dit met uw arts. In de praktijk zal dit betekenen dat u vanaf 0.00 uur 's nachts niets meer mag eten of drinken. U mag dan wel uw medicijnen innemen met een beetje water.

Volg het advies van uw arts.

Kleding en sieraden



Draag ruimzittende, niet-knellende bovenkleding.

Sieraden kunt u gewoon dragen.

Medicijnen



Neem voor uw ziekenhuisbezoek een lijstje mee met de medicijnen die u gebruikt.

Neem voor uw ziekenhuisbezoek het volgende mee:



- Uw aanvraagformulier (als u dat heeft gekregen)
- De pas van uw ziektekostenverzekering
- Een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, rijbewijs, paspoort)
- Een lijstje met de medicijnen die u gebruikt (AMO of Actueel Medicatie Overzicht)

Heeft u nog vragen over dit onderzoek?

Stel uw vragen voor het onderzoek aan uw arts of zorgverlener of neem voor het onderzoek contact op met uw arts.



Na het onderzoek

Bloedverdunners



Als u bloedverdunners gebruikt, heeft een grotere kans op een blauwe plek of een nabloeding van het wondje.

Pleister



Zodra het wondje niet meer bloedt, kunt u de pleister verwijderen.

Verdiepende informatie

Meer informatie over uw onderzoek of behandeling

Wanneer is een bloedonderzoek nodig?



Op [ziekenhuis.nl](https://www.ziekenhuis.nl)

[. \(https://www.ziekenhuis.nl/dossiers/bloedonderzoek/wanneer-is-een-bloedonderzoek-nodig/item25265\)](https://www.ziekenhuis.nl/dossiers/bloedonderzoek/wanneer-is-een-bloedonderzoek-nodig/item25265) is te lezen wanneer een bloed onderzoek nodig is.