



## Begrijpelijke voorlichting met animatievideo's

Je kijkt naar de papieren versie van digitale voorlichting met animatievideo's. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de voorlichting.

## Het onderzoek

Hoe uw onderzoek in zijn werk gaat.

### Arteriepunctie



#### Animatievideo

Deze tekst hoort bij een animatievideo. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de video.

#### Uitgesproken tekst van de video

U komt binnen en neemt plaats op een stoel.

Een medewerker zal u vragen uw arm te ontbloten.

Een deel van uw arm wordt schoongemaakt met een vochtig gaasje en de verpleegkundige zoekt het bloedvat.

Daarna wordt de naald in het bloedvat, de slagader, geprikt.

Dit doet even zeer.

Vervolgens wordt er een buisje bloed bij u afgenomen.

Hierna wordt de naald uit uw arm gehaald en wordt het wondje afgedrukt met een gaasje en een drukverband.

Gewoonlijk duurt het onderzoek zo'n 2 minuten.

Met een arteriepunctie wordt er bloed uit een slagader afgenomen. Hierbij worden bloedgassen gemeten, zoals de hoeveelheid zuurstof en koolzuur in uw bloed.

Het onderzoek duurt in totaal circa 15 minuten.

---

## Medicijnen

Bereid u voor door de onderstaande stappen goed door te lezen.

### Medicijnen



Neem voor uw ziekenhuisbezoek een lijstje mee met de medicijnen die u gebruikt.

---

## Wat neemt u mee?

Bereid u voor door de onderstaande stappen goed door te lezen.

### Neem voor uw ziekenhuisbezoek het volgende mee:



- Uw aanvraagformulier (als u dat heeft gekregen)
- De pas van uw ziektekostenverzekering
- Een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, rijbewijs, paspoort)
- Een lijstje met de medicijnen die u gebruikt (AMO of Actueel Medicatie Overzicht)

---

## Nazorg na uw onderzoek

### Drukverband



Na het onderzoek krijgt u een drukverband. Dit drukverband moet één uur blijven zitten. Dit is afhankelijk van of u bloedverdunners gebruikt.

Hierna mag u het verband thuis zelf verwijderen.

# Risico's

Mogelijke risico's tijdens en na uw onderzoek of behandeling.

## Risico's



De punctieplaats kan nog een tijdje pijnlijk aanvoelen. Ook kunt u op de punctieplaats een flinke blauwe plek krijgen. Deze verdwijnt vanzelf.