

Inleiding

Hysterosalpingografie (HSG)



Binnenkort komt u naar het ziekenhuis voor een hysterosalpingografie. Dit wordt ook wel een HSG of baarmoederfoto genoemd. Tijdens het onderzoek bekijkt de arts uw baarmoeder en uw eileiders. Hier krijgt u meer informatie over het onderzoek.



De zorgverlener kijkt tijdens het onderzoek naar:


- De vorm van uw baarmoeder
- Of de eileiders open zijn
- Of u misschien verklevingen heeft in de buik

Vorbereiding



Moment van het onderzoek

Een HSG wordt meestal gemaakt na de ongesteldheid en voor de eisprong. Uitzonderingen hierop zijn soms mogelijk in overleg met uw arts.



Niet zwanger zijn

Het is belangrijk dat u niet zwanger bent tijdens het onderzoek. Twijfelt u of u zwanger bent? Doe dan een zwangerschapstest.



Afspraak maken


Maak een afspraak voor het onderzoek zodra u ongesteld bent. Doe dit door op werkdagen contact op te nemen met het ziekenhuis.

Medicijnen



Als het nodig is, ontvangt u vooraf een recept voor medicijnen. Deze medicijnen zorgen ervoor dat u geen ontsteking krijgt door het onderzoek.

Pijnmedicatie



Het is aan te raden voor het onderzoek paracetamol, naproxen of diclofenac in te nemen. Uw zorgverlener bespreekt dit met u.

Allergie voor jodium



Tijdens het onderzoek gebruikt de zorgverlener contrastvloeistof. In de contrastvloeistof zit jodium. Meld het aan uw zorgverlener als u hier allergisch voor bent.

Het onderzoek

Video

Video voice-over

De eileiders liggen onder in de buik, dicht bij de baarmoeder. Deze vervoeren de eicellen en de zaadcellen.

Als het niet lukt om zwanger te worden, onderzoekt de arts uw eileiders en baarmoeder. Dit onderzoek noemen we een hysterosalpingografie, ook wel een HSG of baarmoederfoto genoemd.

U ligt op een speciale tafel, met uw benen omhoog en uit elkaar. Uw benen liggen in een steun.

Eerst plaatst de arts een spreider in uw vagina. Dit wordt ook wel een speculum of een eendenbek genoemd. Daarna maakt de arts uw vagina schoon en pakt met een klem de baarmoedermond vast. Daarna brengt de arts een slangetje in uw baarmoeder. Via dit slangetje spuit de arts contrastvloeistof in uw baarmoeder.

Tijdens het inspuiten van de contrastvloeistof worden er röntgenopnames gemaakt. De contrastvloeistof zorgt ervoor dat uw baarmoeder en eileiders zichtbaar zijn.

Zo ziet de arts de vorm van de baarmoeder en of de eileiders niet dicht zitten. Daarna verwijdt de arts het slangetje, de klem en de spreider.


Het onderzoek is klaar.

Spreider



De arts plaatst een spreider in uw vagina. Zo kan de arts uw baarmoedermond goed zien. Een spreider wordt ook wel een speculum of eendenbek genoemd.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.




Risico's

Het onderzoek heeft twee risico's:



- Infectie van de eileiders
- Allergie voor de contrastvloeistof

Ongemak



Het plaatsen van de spreider kan soms als vervelend ervaren worden. Als de zorgverlener uw baarmoedermond vastpakt, kan dit een ongemakkelijk gevoel geven. Het toedienen van de contrastvloeistof kan dezelfde krampgevoelens geven als tijdens uw ongesteldheid. Dit duurt net zo lang als het onderzoek. Meestal is dat 1-2 minuten. Het wordt hierna snel minder.

Controlefoto



Tijdens het onderzoek worden er röntgenopnames gemaakt. De zorgverlener bekijkt met deze opnames of uw eileiders open zijn.

Soms maakt de zorgverlener de volgende dag nog een controlefoto van uw onderbuik. Zo kunnen wij zien of u misschien verklevingen heeft in uw buik. Het maken van een controlefoto doet geen pijn en duurt ongeveer vijf minuten.

Iemand meenemen



U mag één persoon meenemen naar het onderzoek. U mag zelf bepalen wie u meeneemt. Deze persoon krijgt tijdens het onderzoek een loodschort aan. Dit kledingstuk beschermt deze persoon tegen de röntgenstraling.

Na het onderzoek

Niet zelf naar huis rijden



Na het onderzoek mag u naar huis. Wij raden u aan om niet zelf naar huis te rijden.




Contrastvloeistof

De contrastvloeistof verdwijnt vanzelf uit uw lichaam. U kunt een maandverband dragen om dit op te vangen.



De uitslag

Na het onderzoek heeft u een telefonische afspraak met uw zorgverlener. In dit gesprek bespreekt de zorgverlener de uitslag met u.



Krampen

Tijdens het onderzoek kunt u krampen in de onderbuik hebben. Dit kan even vervelend zijn. Na het onderzoek gaan de krampen snel weg.



Contact opnemen

Heel soms kunt u erge buikpijn en hoge koorts (boven 38 graden) krijgen. Neem dan contact op met het ziekenhuis.

Meer informatie

Meer informatie

Wilt u meer informatie over een HSG? Hier vindt u meer informatie:



www.nvog.nl (<https://www.nvog.nl>).