

Injectie onder doorlichting



Begrijpelijke voorlichting met animatievideo's

Dit is de papieren versie van digitale voorlichting met animatievideo's.

Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de voorlichting.

Het onderzoek

Hoe uw onderzoek in zijn werk gaat.

Injectie onder doorlichting



Animatievideo

Deze tekst hoort bij een animatievideo. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de video.

Uitgesproken tekst van de video

Een medewerker brengt u naar de onderzoeksruimte.

Afhankelijk van het te onderzoeken gewricht zal de medewerker...

u vragen om specifieke kleding uit te trekken.

Vervolgens mag u op het scanbed gaan liggen.

Indien nodig kunt u hierbij geholpen worden.

Om het lichaam van de medewerkers te beschermen tegen röntgenstraling dragen zij loden jassen.

Vervolgens wordt de huid op het gewricht gedesinfecteerd met alcohol.

Het kan zijn dat uw onderbroek hierbij nog een beetje omlaag gedaan moet worden.

In de onderzoeksruimte kan het licht wat gedimd zijn...

om de beelden op de schermen beter te kunnen bekijken.

Hierna volgt de prik van de injectienaald.

Dit kan even vervelend zijn.

Door een beetje contrastvloeistof in te spuiten...

ziet de arts of de naald op de goede plek komt.

Vervolgens wordt er met behulp van een röntgenfoto gekeken...

of de naald op de juiste plek zit.

Meestal lukt dit niet in één keer.

Als de naald op de juiste plek zit, wordt er via...

deze naald een pijnstillertje en een ontstekingsremmer in uw gewricht gespoten.

De medewerker geeft aan wanneer het onderzoek klaar is en helpt u verder.

Gewoonlijk duurt het onderzoek zo'n 10 minuten.

Tijdens een injectie onder doorlichting krijgt u een injectie toegediend in uw gewricht, met daarin een pijnstillertje en een ontstekingsremmer. (Hiermee kan uw arts onderzoeken waar uw klacht vandaan komt en welke behandeling het beste bij u past).

Aanmelden

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie, route 22. U kunt zich daar aanmelden bij de aanmeldzuil met uw patiëntenpas. Een vrijwilliger geeft aan waar u in de wachtkamer kunt plaatsnemen.

De behandeling

Deze handeling wordt verricht door de physician assistant van de afdeling Orthopedie.

U neemt in rugligging plaats op de röntgentafel. Eerst wordt de buitenzijde van de heup grondig schoongemaakt met een desinfectiemiddel. Vervolgens wordt met behulp van röntgenstralen nauwkeurig de juiste plaats bepaald en daarna de injectie gegeven.

Voor de injectie in het heupgewricht worden de medicijnen Kenacort en Bupivacaïne gebruikt. Soms wordt er gebruik gemaakt van contrastmiddel, maar meestal niet. Het aanprikken van de huid kan als gevoelig ervaren worden. Bij het inspuiten van de vloeistof kunt u een drukkend gevoel ervaren met soms uitstraling in het been.

Allergieën

Bereid u voor door de onderstaande stappen goed door te lezen.

Heeft u een allergie?



Indien u bloedverdunners gebruikt of allergisch bent voor verdovingsvloeistof Lidocaïne, Bupivacaïne of de pijnstillers Kenacort, dan dient u dit vooraf aan te geven bij de physician assistant.

Wat neemt u mee?

Bereid u voor door de onderstaande stappen goed door te lezen.

Neem voor uw ziekenhuisbezoek het volgende mee:



- Een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, rijbewijs, paspoort)
- Patiëntenpas. Hiermee kunt u zich aanmelden bij de aanmeldzuil van de afdeling Radiologie

Nazorg na uw onderzoek

Nacontrole

Indien u voor het eerst een injectie krijgt wacht u tien minuten in de wachtkamer. Heeft u de injectie vaker gehad, dan hoeft u niet te wachten.

U kunt uw dagelijkse werkzaamheden hervatten. De eerste dagen kan de pijn iets toenemen. Hiervoor kunt u paracetamol of een ontstekingsremmer gebruiken.

Het effect van de injectie kan pas na enkele weken merkbaar zijn.

De uitslag



In de meeste gevallen wordt er geen controle afspraak bij de orthopedisch chirurg ingepland.

Wanneer de injectie na zes weken niet heeft geholpen kunt u telefonisch contact opnemen. Dan wordt er een afspraak voor u gemaakt.

In sommige gevallen wordt er zes weken na de injectie een telefonische afspraak gepland. De orthopedisch chirurg neemt dan contact met u op om het effect te evalueren.

Risico's

Mogelijke risico's tijdens en na uw onderzoek of behandeling.

Bijwerkingen



Na de ingreep kunt u last krijgen van bijwerkingen. De volgende bijwerkingen komen voor:

- Opvliegers (u krijgt het dan in korte tijd heel warm)
- Roodheid van de huid in het gezicht of een koortsig gevoel. Dit is onschuldig, het duidt niet op een allergische reactie en trekt vanzelf weg
- Tijdelijke toename van de zweetproductie
- Hoofdpijn, kortdurende duizeligheid
- Pijn op de injectieplaats. Aan de injectie wordt altijd een plaatselijk verdovend middel toegevoegd om de pijn te verminderen. Desondanks kan de pijn nog enkele dagen aanhouden. U kunt hiervoor bijvoorbeeld paracetamol gebruiken
- Menstruatieverstoring: eenmalige verandering van de eerstvolgende menstruatie (vroeger, langer, meer bloedverlies dan normaal). Deze bijwerking kan ook optreden bij vrouwen in de menopauze
- Als u suikerziekte heeft kan uw glucosegehalte ontregeld raken. Dit gaat binnen enkele dagen tot een week vanzelf weer over. Indien dit langer aanhoudt, neem dan contact op met uw huisarts

Wanneer contact opnemen

U hoeft alleen contact op te nemen met de poli Orthopedie indien:

- De huid ter plaatse van de injectie rood wordt
- U gemeten koorts heeft
- Het geïnjecteerde gewricht pijnlijker wordt
- U jeuk krijgt over het hele lichaam
- Duizeligheid en/of benauwdheidsklachten optreden

De volledige bijsluiter kunt u opvragen bij de polikliniek Orthopedie.

Bij verdere vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de polikliniek Orthopedie via de BeterDichtbij app. Of door te bellen via telefoonnummer 0512 588 805 (aanwezig: maandag t/m vrijdag van 8.30-16.30 uur). Als de polikliniek Orthopedie is gesloten, kunt u bellen met de afdeling Spoedeisende Hulp: 0512 588 146.