

Mantoux test



Begrijpelijke voorlichting met animatievideo's

Je kijkt naar de papieren versie van digitale voorlichting met animatievideo's. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de voorlichting.

Het onderzoek

Hoe uw onderzoek in zijn werk gaat.

Mantoux test



Animatievideo

Deze tekst hoort bij een animatievideo. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de video.

Uitgesproken tekst van de video

U komt komt de ruimte binnen en neemt plaats op een stoel. Een medewerker zal u vragen uw arm te ontbloten.

Het kan zijn dat een deel van uw arm wordt schoongemaakt met een vochtig gaasje.

Via een prikje in uw onderarm wordt er een kleine hoeveelheid vloeistof in de huid gespoten.

Op de plaats van het prikje ontstaat een plekje op de huid.

Soms zet de medewerker hier een cirkeltje omheen om het plekje te markeren.

Vaak verdwijnt dit plekje vanzelf na enkele dagen.

Als u ooit in contact bent geweest met tuberculose, ook wel TBC genoemd, kan het zijn dat het plekje groter, rood of harder wordt.

Een medewerker zal dit na een aantal dagen controleren en doorgeven aan uw zorgverlener.

Hou het plekje ook zelf ook in de gaten om te zien of er een verandering ontstaat.

Gewoonlijk duurt het onderzoek zo'n 2 minuten.

De Mantoux-test is een prik-test om te kijken of u in aanraking bent geweest met tuberculose. Als dit het geval is, heeft uw lichaam antistoffen gemaakt. Deze antistoffen blijven uw hele leven in uw lichaam.

Als u ooit in aanraking bent geweest met tuberculose kan het plekje van de prik rood en/of gezwollen raken.

Uw voorbereiding

Bereid u voor en houd u aan de onderstaande instructies.

Neem voor uw ziekenhuisbezoek het volgende mee:



- Uw aanvraagformulier (als u dat heeft gekregen)
- De pas van uw ziektekostenverzekering
- Een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, rijbewijs, paspoort)
- Een lijstje met de medicijnen die u gebruikt. Dit wordt in sommige ziekenhuizen ook wel een AMO (Actueel Medicatie Overzicht) genoemd

Na het onderzoek

De uitslag van het onderzoek



Na twee tot drie dagen bekijkt de longarts de plaats van de prik op uw onderarm. Als u ooit in aanraking bent geweest met tuberculose dan kan het plekje van de prik rood en/of gezwollen raken.

Bekijk zelf ook elke dag de plek van de prik en vertel de longarts of u een verandering gezien hebt.