

Pleurapunctie diag.



Begrijpelijke voorlichting met animatievideo's

Je kijkt naar de papieren versie van digitale voorlichting met animatievideo's. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de voorlichting.

Het onderzoek

Hoe uw onderzoek in zijn werk gaat.

Pleurapunctie diagnostisch



Animatievideo

Deze tekst hoort bij een animatievideo. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de video.

Uitgesproken tekst van de video

U komt binnen in de onderzoeksruimte waar een medewerker zal vragen om uw bovenlichaam te ontbloten.

Vervolgens mag u plaatsnemen op de onderzoeksbank.

Afhankelijk van de plek waar het vocht zit, zult u moeten zitten of liggen.

Meestal wordt de juiste plek voor de punctie, de prik, bepaald met een echo.

Met een koude gel en een glad apparaatje, de echo kop, wrijft de medewerker over uw huid om het vocht goed in beeld te krijgen.

Als de echo klaar is, wordt uw huid schoongemaakt met een droge doek en wordt de juiste plek voor de punctie bepaald.

Voor u is het belangrijk om stil te blijven zitten of te liggen.

De arts zal de punctie-plaats schoonmaken met een vochtig gaasje.

Vervolgens zal de arts via een naald vocht wegnemen.

Dit kan even zeer doen.

Het afgenomen vocht kan verschillende kleuren hebben en wordt verder onderzocht in het laboratorium.

Daarna haalt de arts de naald uit uw lichaam en wordt het wondje afgeplakt met een pleister.

Het kan zijn dat u na het onderzoek een drukkende of trekkende pijn voelt op uw borst.

Meestal verdwijnt dit gevoel vanzelf.

Na het onderzoek mag u van de onderzoeksbank af en kunt u zich aankleden.

Een pleurapunctie kan soms pijnlijk zijn en duurt gewoonlijk zo'n 5 tot 10 minuten.

Bij een pleurapunctie haalt de arts vocht weg tussen het borstvlies en het longvlies voor nader onderzoek. Soms wordt vooraf een echo gemaakt om het vocht goed in beeld te brengen en de plaats van de punctie te kunnen bepalen.

Uw voorbereiding

Bereid u voor en houd u aan de onderstaande instructies.

Bent u zwanger?



Vertel uw arts ruim voor het onderzoek of u zwanger bent of denkt te zijn.


Autorijden



Een pleurapunctie heeft geen invloed op de rijvaardigheid.

Allergieën

Bereid u voor door de onderstaande stappen goed door te lezen.



Bent u allergisch voor medicijnen?

Vertel uw arts of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen.

Eten en drinken

Bereid u voor door de onderstaande stappen goed door te lezen.

Eten en drinken



U mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken.

Medicijnen

Bereid u voor door de onderstaande stappen goed door te lezen.

Gebruikt u bloedverdunners?



Bespreek dit met uw arts!

Bepaalde bloedverdunnende middelen moeten tijdelijk gestopt worden voor dit onderzoek, bijvoorbeeld:

middelen zoals acenocoumarol (Sintrommitis®), fenprocoumon (Marcoumar®), clopidogrel (Plavix®) of dipyridamol (Persantin®).

In de meeste gevallen mag u Aspirine en Ascal wel gewoon doorgebruiken.

Wat neemt u mee?

Bereid u voor door de onderstaande stappen goed door te lezen.

Neem voor uw ziekenhuisbezoek het volgende mee:



- Uw aanvraagformulier (als u dat heeft gekregen)
- De pas van uw ziektekostenverzekering
- Een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, rijbewijs, paspoort)
- Een lijstje met de medicijnen die u gebruikt. Dit wordt in sommige ziekenhuizen ook wel een AMO (Actueel Medicatie Overzicht) genoemd



Heeft u nog vragen over dit onderzoek?

Stel uw vragen vóór het onderzoek aan uw arts of zorgverlener of neem vóór het onderzoek contact op met uw arts.

Nazorg na uw onderzoek

De uitslag van het onderzoek



De uitslag van het onderzoek zal door uw eigen arts met u worden besproken.

De uitslag van de pleurapunctie duurt meestal enkele dagen omdat het vocht in het laboratorium wordt onderzocht.

Een half uur rust



Het is verstandig om na het onderzoek een half uur rust te nemen. U mag wel rondlopen tenzij de arts anders met u bespreekt.

Aanvullend onderzoek



Het kan zijn dat de arts na het onderzoek nog een röntgenonderzoek van de longen wil laten maken. Dat kan nodig zijn om het effect van de punctie te beoordelen.

Mogelijke complicaties

Informatie over mogelijke complicaties na uw onderzoek of therapie

Mogelijke complicaties



Complicaties komen niet vaak voor, maar de volgende complicaties kunnen optreden:

Een draaierig gevoel

Het kan zijn dat u een draaierig gevoel ervaart tijdens het onderzoek.

Benauwdheid

Dit verdwijnt normaal gesproken binnen korte tijd. Voelt u zich na de punctie heel benauwd, waarschuwt u dan direct de verpleegkundige. Als u thuis heel benauwd raakt bel dan meteen uw huisarts of neem contact op met de longarts.

Pijnlijke punctieplaats

De punctieplaats kan nog een tijdje pijnlijk aanvoelen, alsof u een 'blauwe plek' heeft.

Een trekkend of drukkend gevoel op de borst

Een klaplong

Een enkele keer kan er een klaplong ontstaan na een punctie. Meestal geeft dit klachten van hoesten, pijn of kortademigheid.

Een bloeding in de borstkas

Dit is een zeldzame complicatie