

Inleiding

Omdat u een urodynamisch onderzoek ondergaat, vragen wij u de volgende vragen over de MRSA/BMRO bacterie te beantwoorden. Beantwoordt u een van deze vragen met ja, neem dan contact op met het secretariaat van de polikliniek urologie.

- Bent u drager van MRSA/BMRO?
- Bent u de afgelopen 2 maanden opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis of zorginstelling?
- Heeft u de afgelopen 2 maanden verbleven in een zorginstelling met een MRSA/BMRO probleem of onbeschermd contact gehad met een MRSA positieve patient?
- Heeft u contact gehad met levende mestvarkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden?

Urodynamisch onderzoek



U krijgt binnenkort een urodynamisch onderzoek. Het onderzoek wordt gedaan bij mensen die klachten hebben bij het plassen, zoals het moeilijk kunnen plassen of ongewild urineverlies. Tijdens dit onderzoek wordt de functie van de blaas, de plasbuis en de bekkenbodem gemeten. Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 60 minuten.

voorbereiding

Blaasontsteking



Heeft u op de dag van het onderzoek blaasontsteking (of klachten die daarop lijken) en gebruikt u antibiotica? Neem dan contact op met de polikliniek Urologie. Het onderzoek kan dan niet doorgaan en de afspraak wordt verzet.

Medicatie

Gebruikt u blaas remmende medicatie dan wordt er in overleg met de uroloog afgesproken deze 5 dagen van tevoren te stoppen.

Het onderzoek

Video

Video voice-over

Een urodynamisch onderzoek is een onderzoek naar de werking van de blaas en de plasbuis.

Tijdens het onderzoek wordt er onderzocht hoe het ophouden van plas, en het uitplassen gaat.

Het doel is om achter de oorzaak te komen van plasklachten. Zoals moeilijk kunnen plassen of ongewild urineverlies.

Wanneer het onderzoek begint neemt u plaats op een speciale onderzoeksstoel.

De zorgverlener maakt het gebied rondom de plasbuis schoon.

Daarna worden er twee slangetjes ingebracht. Eén slangetje in de plasbuis om de blaasdruk te meten en één slangetje in de endeldarm om de buikdruk te meten. Het inbrengen van deze slangetjes kan vervelend zijn.

Daarnaast krijgt u elektroden op uw bovenbeen en billen om de spanning van de bekkenbodemspieren te kunnen meten.

Daarna starten de metingen.

Uw blaas wordt gevuld met steriel water.

De computer meet de druk in de blaas en buik.

Tijdens het vullen moet u een aantal keer aangeven wat u voelt in uw blaas. U geeft aan of u aandrang voelt, of u normaal gesproken zou gaan plassen of dat u erg nodig moet plassen.

Tijdens het onderzoek plast u het water uit. Hierbij meten de ingebrachte slangetjes de plasstraal.

Daarna is het onderzoek klaar.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig. Voor het onderzoek moet u 'leeg plassen' op een gewoon toilet. Vervolgens meldt u zich op de afgesproken tijd bij de balie van de polikliniek Urologie en neemt u plaats in de wachtkamer. U wordt opgeroepen door een verpleegkundige die u meeneemt naar een onderzoekkamer. Hier kleedt u zich van onderen uit. Daarna neemt u plaats op de behandelstoel. Er wordt een echo gemaakt van de blaas om te kijken of er nog urine in de blaas zit. Vervolgens worden twee dunne meetkatheters ingebracht. Bij de vrouw één in de blaas en de ander in de vagina of in het rectum (=anus). Bij de man één in de blaas en de ander in het rectum (=anus). Deze katheters zijn aangesloten op een computer, die de werking van de spieren registreert. De beide katheters worden ingebracht met een verdovend glijmiddel. Er worden ook drie stickers geplakt die de bekkenbodemspieren registreren. Eén sticker komt op het bovenbeen, de andere twee op de billen (rond de anus).

Na het inbrengen van de katheters wordt de behandelstoel in de zitstand gebracht en het toilet aangesloten. De blaas wordt nu langzaam gevuld met water. Tijdens het onderzoek moet u aangeven wat u voelt en moet u regelmatig hoesten. Wanneer u flinke aandrang heeft om te plassen, stoppen we met het vullen van de blaas. U mag dan plassen. De computer in het toilet registreert alle gegevens.

Na het onderzoek

Na het onderzoek



De plasbuis kan geïrriteerd raken door de slangetjes.

- U kunt dan last hebben van pijn en een branderig gevoel bij het plassen en/of het gevoel nodig te moeten plassen (verhoogde aandrang)
- U kunt last hebben van wat bloedverlies via de plasbuis of bloed in de urine

U hoeft zich hierover niet ongerust te maken. De klachten verdwijnen meestal vanzelf binnen een paar dagen.

Om ervoor te zorgen dat de irritaties sneller afnemen, is het goed de rest van de dag van het onderzoek extra te drinken.

Neem bij deze klachten contact op met uw arts



Bij plas klachten die lijken op blaas ontsteking, laat dan uw urine onderzoeken bij uw huisarts.

In een aantal gevallen moet u wel contact opnemen met uw uroloog, namelijk:

- als uw klachten langer dan vier dagen duren
- als u koorts krijgt
- als de pijn erger wordt
- als u veel moeilijker kunt plassen

Overdag kunt u bellen met de polikliniek waar u onder behandeling bent. 's Avonds en in het weekend kunt u bellen met de huisartsenpost.

De uitslag van het onderzoek



De specialist geeft u de uitslag van het onderzoek tijdens een afspraak op de polikliniek.

verhinderd

Als u verhinderd bent of heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Urologie telefoonnummer 0512 588 811.