

Bovenooglidcorrectie



Begrijpelijke voorlichting met animatievideo's

Dit is de papieren versie van digitale voorlichting met animatievideo's.

Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de voorlichting.

In het kort



U heeft te veel huid boven uw oog. Daarom krijgt u een bovenooglidcorrectie. Of u wilt onderzoeken of u dit wilt. Bij een bovenooglidcorrectie haalt de arts het teveel aan huid boven het oog weg. Hier ziet u hoe dat gaat. En wat u kunt verwachten.

Doel van de behandeling



Doordat de arts het teveel aan huid weghaalt, voelen uw oogleden minder zwaar. En kunt u vaak makkelijker kijken. Heeft u last van hoofdpijn of vermoeidheid? Door de behandeling nemen deze klachten vaak af.

Vorbereiding



Medicijnen

Gebruikt u medicijnen? Overleg met uw zorgverlener of u uw medicijnen kunt blijven gebruiken.



Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunners? Geef dit dan vooraf door aan uw zorgverlener. U moet hier misschien mee stoppen voor de behandeling



Draag geen crèmes of make-up

Verwijder voor de behandeling uw make-up en gezichtscrèmes.



Eten en drinken

Voor de behandeling mag u gewoon eten en drinken.



Niet zelf autorijden

U mag na de behandeling niet zelf autorijden. Vraag daarom of iemand u thuis kan brengen.

Kosten en vergoeding



Soms vergoedt de zorgverzekeraar een deel of alle kosten van de bovenooglidcorrectie. Hiervoor gelden strenge voorwaarden. Uw zorgverlener bespreekt dit met u.

De behandeling



Animatievideo

Deze tekst hoort bij een animatievideo. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de video.

Uitgesproken tekst van de video

U heeft last van zware of hangende oogleden.

Dat komt doordat er te veel huid boven uw ooglid zit.

Daarom krijgt u een boven ooglidcorrectie.

De behandeling gebeurt in de behandelkamer.

Eerst tekent de arts af welke huid weggehaald moet worden.

Daarna gaat u liggen.

We maken uw huid schoon...

en dekken het af met een doek.

U krijgt een verdoving.

De arts maakt een snee...

en haalt het teveel aan huid weg.

Soms haalt de arts ook wat vet weg.

We maken de wond dicht.

De behandeling is klaar.

De behandeling duurt 45 tot 60 minuten



Behandeling aan beide ogen



U krijgt meestal een behandeling aan beide ogen. Deze behandeling vindt op hetzelfde moment plaats.

Soms ook vet en spier weghalen



De arts haalt het teveel aan huid weg. Soms haalt de arts ook een beetje spier of vet weg als dat nodig is.

Litteken



Het litteken valt in de plooi van uw oog. Daardoor valt het meestal niet op. Het kan zijn dat er na de behandeling een klein verschil tussen beide oogleden is. Dat noemen we asymmetrie.

Na de behandeling

Klachten na de behandeling

Na de behandeling kan uw ooglid dik en blauw worden. Er kan ook een bloeding ontstaan. Dit gaat vanzelf over.




Ooglid koelen



We adviseren u om de eerste dagen regelmatig uw oog te koelen.

Geen zware dingen tillen




Til de eerste twee weken geen zware dingen.

Niet sporten



Het is belangrijk om de eerste twee weken na de behandeling niet te sporten.



Hechtingen verwijderen

Na een week verwijdt de zorgverlener uw hechtingen. De zorgverlener bekijkt dan ook hoe het met de wond gaat.

Complicaties

Bij elke behandeling kunnen problemen voorkomen. Dit noemen we complicaties. Hier leggen we de complicaties aan u uit.

Complicaties



U kunt de volgende problemen hebben:

- Een nabloeding
- Een infectie van de wond
- Een slechte genezing van de wond
- Blauwe plekken
- Een bloeding achter het oog. Dit kan voor blindheid zorgen. Dit komt bijna nooit voor



Contact opnemen

Neem contact op met uw zorgverlener bij de volgende klachten:

- Een ontsteking
- Als de wond veel bloedt