

EUS (endoscopische echografie via de slokdarm)

Inleiding	2
Wat houdt het onderzoek in?	2
Voor het onderzoek	3
De dag van het onderzoek	4
Het onderzoek	4
Na het onderzoek	5
Mogelijke complicaties	6

Inleiding

U komt binnenkort naar het Behandelhuis (route 43) van Nij Smellinghe voor een EUS (endoscopische echografie via de slokdarm).

In deze folder krijgt u informatie over het onderzoek. Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan een medewerker van de polikliniek Longgeneeskunde. De polikliniek Longgeneeskunde is te bereiken op telefoonnummer 0512-58 88 16.

Afspraak:

Dag	
Tijd	
Plaats	Behandelhuis route 43
Behandelaar	

Wat houdt het onderzoek in?

Een EUS-FNA is een combinatie van een endoscopie (in de slokdarm) en een echo. De arts kan op deze manier de omgeving aan de buitenkant van de slokdarm bekijken, waaronder de lymfeklieren. Ook kan de arts tijdens het onderzoek weefsel afnemen via een punctie voor aanvullend onderzoek.

Voor het onderzoek

Overleg met uw behandeld arts als u:

- Antistollingsmiddelen gebruikt
- Diabeet bent of vanwege andere gezondheidsproblemen 's ochtends medicijnen moet gebruiken
- Allergisch bent voor medicijnen
- Zwanger bent

Soms is het noodzakelijk dat u tijdelijk stopt met het gebruik van uw medicijnen. Wanneer dit nodig is, geeft de arts dit aan. Stopt u alstublieft nooit zonder overleg met uw medicijnen!

Vorbereiding voor het onderzoek

Voor het onderzoek mag u minimaal zes uren niet meer eten en drinken. Zie voor verdere instructies de folder Sedatie.

3

Mocht de arts u andere instructies hebben gegeven volgt u altijd de instructies van uw arts.

Sedatie

Tijdens het onderzoek krijgt u sedatie. U krijgt medicijnen toegediend via een infuus waar u slaperig van wordt, zodat het onderzoek minder belastend voor u is. Meer informatie over sedatie vind u in de folder Sedatie.

Vanwege de sedatie mag u na het onderzoek niet alleen het behandelhuis verlaten. Ook mag u de gehele dag niet meer deelnemen aan het verkeer. Laat u daarom door iemand ophalen uit het behandelhuis.

De dag van het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich met uw patiëntenpas op het behandelhuis. Neemt u alstublieft ook een geldig identificatiebewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) mee. Nadat u zich heeft aangemeld, kunt u plaatsnemen in de wachtkamer.

U krijgt voor het onderzoek een korte uitleg van de endoscopieverpleegkundige. Zij zal een infuus inbrengen in verband met de sedatie. Tijdens het onderzoek wordt uw bloeddruk gemeten en krijgt u een knijper (pulsoxymeter) op uw vinger om tijdens de behandeling uw hartslag en zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. De vingers dienen nagellakvrij te zijn.

Heeft u een eigen gebit, dan krijgt u tijdens het onderzoek een bijtring (mondstuk) in. Hiermee wordt uw gebit en de endoscoop beschermd.

Heeft u een gebitsprothese, dan vragen wij u die voor het onderzoek uit te doen.

U hoeft zich voor dit onderzoek niet uit te kleden. Wel is het prettig om makkelijk zittende kleding te dragen.

Het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek zal de arts, endoscopieverpleegkundige of anesthesiemedewerker uw keel verdoven met verdovingspray of u een drankje geven met verdovingsvloeistof. Ook wordt er sedatie toegediend via het infuus wat is ingebracht. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank of bed. Met een neusslangetje krijgt u tijdens het onderzoek extra zuurstof toegediend.

Via de mond wordt er een buigzame slang (endoscoop) in de slokdarm gebracht. Het inbrengen van de endoscoop kan als vervelend worden ervaren, maar doet geen pijn. U kunt tijdens het inbrengen en gedurende het onderzoek vrij blijven ademen. De arts bekijkt gedurende het onderzoek de omgeving van de slokdarm, zoals de lymfeklieren en (linker) bijnier. Deze beelden worden op een beeldscherm weergegeven. Ondertussen gaat de arts op zoek naar vergrote lymfeklieren of ander afwijkend weefsel. Via de endoscoop kan de arts weefsel wegnemen voor aanvullend onderzoek.

Als het onderzoek klaar is wordt de endoscoop voorzichtig uit de slokdarm verwijderd. Dit doet geen pijn. Het onderzoek zelf duurt ongeveer 30 minuten.

5

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek wordt u gedurende minimaal één tot twee uur geobserveerd op de uitslaapkamer van het behandelhuis. Tijdens deze observatietijd mag u niet eten of drinken. Ook kan uw keel na het onderzoek wat pijnlijk aanvoelen. Dit pijnlijke gevoel verdwijnt vanzelf.

Na de observatietijd kan u worden opgehaald van het Behandelhuis.

Na het onderzoek hoort u hoe het onderzoek is verlopen. Als er biopten (stukjes weefsel) zijn genomen wordt er een afspraak voor u gemaakt om de definitieve uitslag met uw behandeld arts te bespreken.

Mogelijke complicaties

Een EUS is een veilig onderzoek, maar er kunnen soms complicaties optreden. Enkele uren na het onderzoek kan u last hebben van de volgende verschijnselen:

- Pijnlijke keel
- Kriebelhoest

Deze verschijnselen zijn normaal en verdwijnen gewoonlijk na een aantal uren.

Ook kunnen er na het onderzoek de volgende complicaties optreden:

- Kans op infectie bij verslikking; Een infectie van de luchtwegen kan ontstaan als u zich verslikt in de maaginhoud tijdens het braken. Dit kan gebeuren doordat u een rustgevend medicijn hebt gekregen.
- Scheurtje in de keel, slokdarm of maag; Soms kan er een scheurtje in de keel, de slokdarm of de maag ontstaan tijdens het onderzoek. Dit kan komen door het moeilijk passeren van de keel of door vernauwingen in de slokdarm of maag

Waarschuw direct uw behandeld arts als na een EUS de volgende klachten optreden:

- Hevige, plotselinge buikpijn of aanhoudende buikpijn in de dagen na het onderzoek
- Pijn op de borst
- Koorts
- Hevig, plotseling bloedbraken

Overdag kunt u contact opnemen met de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer 0512 - 58 88 16. 's Avonds en in het weekend belt u met de receptie van het ziekenhuis. Telefoonnummer 0512 - 58 88 88. U kunt dan vragen naar de afdeling Spoedeisende Hulp.