
Oraal: dranken en suspensies

Slikklachten of kinderdoseringen kunnen een reden zijn dat de beschikbare tabletten niet geschikt zijn voor toediening, dranken of suspensies kunnen dan uitkomst bieden. Onderstaand zijn een aantal dranken en suspensies weergegeven die wij regelmatig hebben gemaakt. De volumes van de dranken zijn in overleg aan te passen.

- Amlodipinesuspensie 1 mg/ml 100 ml
- Baclofen drank 1 mg/ml 300 ml
- Captoprildrank 1 mg/ml 300 ml
- Carvedilolsuspensie 1 mg/ml 100 ml
- Clioquinolsuspensie 100 mg/ml FNA 100 ml
- Clonidinedrank 0,01 mg/ml 300 ml
- Dexamethasondrank 1 mg/ml FNA 100 ml
- Enalaprilmaleaatdrank 1mg/ml FNA 300 ml
- Fenytoïnesuspensie 15 mg/ml FNA 100 ml
- Fosfaatdrank 1 mmol=1 ml 300 ml
- Indometacinesuspensie 5 mg/ml 100 ml
- Kaliumchloridedrank 75 mg/ml FNA 300 ml
- Kaliumcitraatdrank 144 mg/ml 500 ml
- Kaliumcitraatdrank 144 mg/ml 1000 ml
- Magnesiumsulfaatdrank 20% 1000 ml
- Nitrofurantoïnesuspensie 10 mg/ml 100 ml
- Prednisolondrank 1 mg/ml FNA 100 ml
- Propranololhydrochloridedrank 1 mg/ml FNA100 ml
- Riboflavinedrank 25 mg/ml 100ml
- SDD-suspensie 300 ml
- Sulfasalazinesuspensie 100 mg/ml FNA 300 ml
- Tacrolimussuspensie 0,5 mg/ml 100 ml
- Vancomycinedrank 50 mg/ml 100 ml