

Ganglion stellatum blokkade

Stellatum blokkade	2
Complicaties	2
Bijwerkingen	2
Bereikbaarheid	4

Deze folder is bestemd voor patiënten die in aanmerking komen voor een blokkade van het ganglion stellatum (= stervormig zenuwknopje) met een lokaal anestheticum of met PRF-behandeling.

Deze behandeling wordt in een aantal gevallen toegepast bij zenuwpijnen in de onderkaak, nek, schouder, borst en arm. Ook wordt deze behandeling soms toegepast bij een complex regionaal pijnsyndroom (sympathische reflex dystrofie) van de arm.

Stellatum blokkade

De blokkade van het ganglion stellatum met lokale anesthetica is een behandeling waarbij met behulp van een naald een zenuwknopje van het onwillekeurige zenuwstelsel voor de zevende nekzwervel in de hals wordt verdoofd. Bij de behandeling wordt een naald via de hals geplaatst bij het zenuwknopje. De positie van de naald wordt met echo bevestigd. Vervolgens wordt de verdoving ingespoten.

Vervolgens wordt de naaldpositie gecontroleerd met een stroompje en wordt na verdere verdoving de naaldpunt tot een bepaalde temperatuur verwarmd.

Complicaties

Als zeer zeldzame complicatie kan het longvlies worden geraakt, waardoor een klaplong (pneumothorax) kan optreden. De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd; desalniettemin bestaat er een geringe kans op deze complicatie. Verder kunt u allergisch zijn voor röntgencontrastvloeistof. Dit uit zich in jeuk, huiduitslag en eventueel kortademigheid. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot een ernstige bloeddrukdaling.

Bijwerkingen

Direct na de behandeling kunt u met het oog wat wazig zien of kan het ooglid wat afhangen. Ook kunt u even een hese stem hebben. Dit is van tijdelijke aard. Na de behandeling kan napijn optreden, die enkele dagen kan duren. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld Paracetamol volgens bijsluiter).

Let op! De anticonceptiepil kan gedurende de cyclus minder betrouwbaar zijn.

Iedere behandeling brengt een risico met zich mee. De behandeling leidt zelden tot ongewenste, blijvende schade. De anesthesioloog/pijnspecialist overlegt met u als de behandeling voor u bijzondere risico's met zich meebrengt.

Bij complicaties na een behandeling kunt u op werkdagen maandag t/m vrijdag contact opnemen met het Pijncentrum tussen 08.30 en 12.00 uur op telefoonnummer 0512 588 381 en tussen 12.00 en 16.30 uur kunt u via de receptie op telefoonnummer 0512 588 888 vragen naar het Pijncentrum. Na kantoortijd kunt u contact opnemen met de Dokterswacht.

Bereikbaarheid

Het Pijncentrum bevindt zich op de eerste verdieping van ziekenhuis Nij Smellinghe, via ingang Zuid.

De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag.

Elke werkdag is het Pijncentrum van 8.30 tot 12.00 uur telefonisch te bereiken op telefoonnummer 0512 588 381, onder andere om een afspraak te maken.

4

Meer informatie over het Pijncentrum vindt u op www.nijsmellinghe.nl/pijncentrum.