

Behandeling met PRF

Belangrijk	2
De behandeling	2
Weer thuis	4
Heeft u vragen?	4

PRF staat voor Puls Radio Frequente stroom. Het is een behandeling om pijn te verminderen in bepaalde zenuwen. Bij de blokkade wordt de betreffende zenuw geblokkeerd door een elektrisch stroompje gedurende een paar minuten. Deze behandeling kan volgen op een eerdere proefblokkade.

Belangrijk

- Gebruikt u bloedverdunners? Geeft u dit alstublieft door aan uw arts. De arts bespreekt dan met u hoelang u van tevoren moet staken met de bloedverdunners
- Heeft u een pacemaker of ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator)? Geeft u dit a.u.b. door aan uw arts
- Bent u zwanger, dan kan de behandeling niet plaatsvinden
- Wanneer u diabeet bent, kunnen de bloedsuikerwaarden variëren
- Bent u ergens allergisch voor? Geeft u dit alstublieft door aan uw arts
- De anticonceptiepil is tot aan de eerste menstruatie niet betrouwbaar.
- Twee weken voor en twee dagen na de grieprik / Covid vaccin mag u geen behandeling met PRF ondergaan.

De behandeling

De behandeling vindt plaats op het Pijncentrum.

U kunt zich melden via de aanmeldzuil in de gang. Daarna kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Nadat de arts u heeft uitgelegd hoe de behandeling in zijn werk gaat, kunt u plaatsnemen op de behandeltafel. U ligt op uw buik of op uw rug, afhankelijk van de plaats van behandeling. Wordt voor de behandeling gebruik gemaakt van het röntgenapparaat, dan krijgt u een kleine hoeveelheid contrastvloeistof toegediend. Via röntgenstraling zoekt de pijnarts de juiste plek in uw lichaam die behandeld moet worden.

Vervolgens spuit de arts de verdovende vloeistof in. De naald wordt verwarmd via pulsradiofrequente stroom (PRF). Warmte heeft invloed op de pijngleiding, waardoor in veel gevallen een vermindering van pijn optreedt. De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Na de behandeling gaat u nog even naar de nazorgruimte. Daar wordt uw bloeddruk gemeten en krijgt u een controle-afspraak van de secretaresse. Als u zich goed voelt, mag u naar huis.

Let op: na de behandeling mag u niet autorijden. U moet voor vervoer zorgen!

Een behandeling kan een risico met zich meebrengen. De zenuwblokkade leidt echter zelden tot ongewenste, blijvende schade. Desalniettemin bestaat er een kleine kans op een complicatie. De pijnspecialist bespreekt dit voor aanvang van de behandeling met u.

De hierna genoemde complicaties en/of bijwerkingen na een behandeling met pRF kunnen optreden:

- Een bloeditstorting ten gevolge van het raken van een bloedvat bij het prikken
- Mogelijk tijdelijk een verdoofd gevoel in het been of de arm, afhankelijk waar de behandeling heeft plaatsgevonden
- Tijdelijke toename van pijn na de behandeling
- Opvliegers
- Bij het prikken ter hoogte van de borstkas kan het longvlies geraakt worden. Hierdoor bestaat er kans op een klaplong. Een ziekenhuisopname kan dan nodig zijn

Bij complicaties na een behandeling kunt u op werkdagen (maandag t/m vrijdag) contact opnemen met het Pijncentrum tussen 08.30 en 12.00 uur op telefoonnummer 0512 588 381 en tussen 12.00 en 16.30 uur kunt u via de receptie op telefoonnummer 0512 588 888 vragen naar het Pijncentrum. Na kantoortijd kunt u contact opnemen met de Dokterswacht.

Weer thuis

Op de plek van de prik wordt een pleister geplakt, deze kunt u 's avonds of de volgende dag verwijderen.

U kunt na de behandeling last hebben van pijn. Deze pijn kan enkele weken aanhouden. Daarvoor kunt u een pijnstillert innemen. Als dit niet voldoende helpt, kunt u contact opnemen met het pijncentrum of de huisarts.

4

Pas na enkele weken kunt u bemerken of de behandeling effect heeft gehad.

U krijgt een controle-afspraken mee voor circa acht tot 12 weken na de behandeling.

Heeft u vragen?

Mocht u na het lezen van deze folder vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.