

# Intra-uteriene inseminatie (IUI)

Algemeen	2
Wat is intra-uteriene inseminatie?	2
Voor wie is IUI?	3
Hoe groot is de kans op een zwangerschap bij IUI?	3
Hoe verloopt eierstokstimulatie	4
Sperma	5
Hoe verloopt de inseminatie?	5
Na de inseminatie	6
Bijwerkingen en complicaties	6
Een spannende tijd	7
Nuttige adressen	8

## Algemeen

IUI - intra-uteriene inseminatie - is het inbrengen van zaadcellen in de baarmoederholte. Deze behandeling wordt toegepast bij een verminderde kwaliteit van de zaadcellen of een te laag aantal zaadcellen, na een periode van uitblijven van een zwangerschap zonder duidelijke oorzaak, of bij een verminderde kwaliteit van het slijm van de baarmoedermond. Uit het sperma worden de beste zaadcellen geselecteerd en in de baarmoederholte ingebracht ten tijde van de eisprong. De eisprong wordt meestal ondersteund met hormonen. Het moment van de eisprong wordt bepaald met behulp van echoscopie en hcg injecties.

De kans op een zwangerschap bij IUI is ongeveer 1 op de 10 behandelingen. Meestal vinden er 3 tot 6 behandelingen plaats.

2

## Wat is intra-uteriene inseminatie?

Intra-uteriene inseminatie (IUI) is het inbrengen (insemineren) van zaadcellen direct in de baarmoeder (intra-uterien). In de normale situatie komt na een zaadlozing in de vagina het sperma met de zaadcellen in de buurt van de baarmoedermond. Via het slijm van de baarmoedermond komen de zaadcellen via de baarmoederholte in de eileiders, waar de bevruchting van een eikel kan plaatsvinden.

Zaadcellen komen via de vagina, baarmoeder en baarmoederholte in de eileider terecht en kunnen daar de eikel, die is vrijgekomen uit de eierstok, bevruchten.

Bij IUI worden de beste zaadcellen geselecteerd en rechtstreeks in de baarmoederholte gebracht. De zaadcellen zijn dan dichterbij de plaats van bevruchting.

Een goede timing van de IUI is van belang, omdat de kans op een zwangerschap het hoogst is als IUI wordt uitgevoerd omstreeks de dag van de eisprong. Regelmatig wordt de IUI-behandeling ondersteund met hormonen.

## Voor wie is IUI?

U kunt voor IUI in aanmerking komen in de volgende situaties:

- De kwaliteit van het zaad is minder dan normaal
- Het aantal zaadcellen is minder dan normaal
- U hebt maximaal twee jaar onbeschermdе gemeenschap gehad, maar u bent niet zwanger geworden; een duidelijke oorzaak is niet gevonden

De kans op een zwangerschap is in ongeveer de eerste drie jaar van onbeschermdе gemeenschap groter dan bij behandeling. Als er geen oorzaak wordt gevonden, wordt daarom eerst een tijdje afgewacht of niet spontaan een zwangerschap optreedt. Hoe lang deze periode duurt, is afhankelijk van uw leeftijd. In ziekenhuis Nij Smellinghe worden alleen inseminatiebehandelingen uitgevoerd met zaad van de partner. Donorinseminaties zijn niet mogelijk.

## Hoe groot is de kans op een zwangerschap bij IUI?

Ook hier is uw leeftijd van belang. IUI leidt gemiddeld bij 1 op de 10 behandelingen tot een zwangerschap. Na zes behandelingen is de kans dat u zwanger bent geraakt, ongeveer 25 tot 35 procent. De meeste vrouwen zijn dus na zes behandelingen nog niet zwanger. Uw arts zal hierna met u en uw partner een nieuwe afweging maken: doorgaan met IUI, overstappen op een andere behandeling, bijvoorbeeld IVF (reageerbuisbevruchting) of stoppen met behandelen.

## Hormonen, gecontroleerde hyperstimulatie

De arts zal regelmatig adviseren IUI te combineren met het gebruik van hormonen om de groei van de eiblaasjes (follikels) te stimuleren of om de timing van de eisprong te verbeteren. Door deze combinatie kan de kans op zwangerschap toenemen, met name als de oorzaak onduidelijk is of als het zaad verminderd is. Bij de hormoonbehandeling gebruikt u onderhuidse injecties (gonadotrofinen: FSH of hMG). Het injecteren kunt u zelf leren. Over de noodzaak en de precieze uitvoering van deze behandeling kunt u met de arts verder praten.

## Hoe verloopt eierstokstimulatie

U krijgt Ovaleap vanaf de 3e of 4e cyclusedag. Op die dag wordt altijd een zogenaamde uitgangsechografie gedaan om na te gaan of u de behandeling veilig kunt starten. Vooraf krijgt u instructies hoe de injecties moeten worden toegediend. De Ovaleap pen wordt meegegeven op de polikliniek. **De ampullen en naaldjes worden via de apotheek uitgegeven.** De daaropvolgende echocontrole is op de 9e à 10e cyclusedag. Alle tussenliggende dagen moet de Ovaleap bij voorkeur 's avonds worden gegeven tussen 18.00 en 20.00 uur. Bij de vervolgecho's wordt vastgesteld of u nog met de Ovaleap moet doorgaan. Het echoscopisch onderzoek wordt meestal na een of meerdere dagen herhaald, afhankelijk van de reactie van uw eierstokken op de medicijnen.

Wanneer bij het echo-onderzoek blijkt dat er een of meer sprongrijpe follikels (eiblaasjes, deze bevatten de eicel) zijn, wordt de stimulatie afgesloten met een injectie HCG. HCG lijkt op LH en zet de eisprong in gang. 36 uur na de toediening van HCG, dus kort voor de ovulatie, wordt de inseminatie gedaan.

Dit betekent dat u de HCG precies op de afgesproken tijd moet toedienen.

Zijn er teveel follikels en is er dus een te grote kans op meerlingzwangerschap of overstimulatie, dan wordt de behandeling afgebroken. Er wordt geen HCG toegediend en dus niet geïnsemineerd. Eventuele overstimulatie kan zo worden voorkomen. Meestal kan in een volgende maand de inseminatie met een aangepast behandel-schema wél worden uitgevoerd.

*Ziekten (met name met koorts) bij de man of medicijngebruik kunnen de zaadkwaliteit gedurende meerdere maanden nadelig beïnvloeden. Wilt u bij twijfel altijd met de fertiliteitsarts te overleggen, vóór u met een behandeling begint.*

5

## Sperma

Sperma bestaat voor het grootste gedeelte uit vloeistof waarin zich de zaadcellen bevinden. Voor de inseminatie zijn alleen de zaadcellen nodig; deze worden gescheiden van de vloeistof. Hierbij vermindert het aantal, maar blijven de beste zaadcellen over. Deze bewerking duurt ongeveer 1,5 uur. IUI is alleen zinvol als er na bewerking meer dan 1 miljoen beweeglijke zaadcellen zijn overgebleven. Om de beste opbrengst aan sperma te krijgen, kan het verstandig te zijn om gedurende twee dagen voor de IUI geen zaadlozing te hebben. Op de dag van de IUI moet de man door masturbatie sperma opwekken. Dit kan thuis.

## Hoe verloopt de inseminatie?

De inseminatie vindt plaats in de polikliniek. De arts of fertiliteitsverpleegkundige brengt een speculum (spreider) in om de baarmoedermond te zien.

Dan wordt een dun slangetje door de baarmoedermond in de baarmoederholte geschoven, waardoor het bewerkte sperma wordt ingebracht. Meestal hebt u hierbij geen pijn, al kan er heel soms een licht krampend gevoel in de onderbuik ontstaan. Na de behandeling is het gebruikelijk 10 min. te blijven liggen. Daarna kunt u weer naar huis.

## Na de inseminatie

Na de IUI zijn er geen bijzondere maatregelen nodig. Wanneer u niet zwanger bent geworden, krijgt u 12 tot 14 dagen na de IUI een menstruatie. U kunt ongeveer 14 dagen na de dag van IUI een zwangerschapstest doen.

## Bijwerkingen en complicaties

### Infectie

Bij elke IUI bestaat een zeer kleine kans op infectie. Als u koorts krijgt (38 graden of hoger), buikpijn of afscheiding anders dan normaal, neem dan contact op met uw behandelend arts. De volgende bijwerkingen en complicaties komen voornamelijk voor bij het gebruik van hormonen, dus in de gestimuleerde cyclus.

### Meerlingzwangerschap

De kans op een meerling is enigszins in te schatten door het aantal eiblaasjes dat bij echoscopie te zien is. Zijn er te veel eiblaasjes, dan zal de arts u afraden om in die cyclus zwanger te raken. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er wel een meerlingzwangerschap ontstaan. Wanneer u hormonen gebruikt die de groei van de eiblaasjes stimuleren is de kans bij injecties ongeveer 20 procent. De kans op een drieling is kleiner dan 1 procent.

## **Vocht vasthouden, misselijkheid en stemmingsverandering**

Hormoongebruik ter ondersteuning van de IUI geeft soms bijwerkingen zoals vocht vasthouden, misselijkheid en verandering van stemming.

## **Ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS)**

Soms ontstaan er tijdens de behandeling met hormonen onverwacht meerdere eiblaasjes. Als in die situatie wordt doorgegaan met stimulatie met hormonen, met name met injecties, kan er een ernstige overstimulatie van de eierstokken ontstaan: het ovarieel hyperstimulatiesyndroom. Deze complicatie is zeldzaam, maar de gevolgen kunnen ernstig zijn. U kunt buikpijn krijgen of een opgeblazen gevoel, misselijk worden en/of overgeven. Soms is opname in het ziekenhuis nodig. Als er te veel eiblaasjes zijn gegroeid, raadt de arts u af om zwanger te raken. Dan zal de IUI niet doorgaan en krijgt u het advies om geen gemeenschap te hebben.

Van de hormonen die gebruikt worden bij IUI is geen verhoogd risico op het ontstaan van kanker bekend.

## **Een spannende tijd**

Elke behandeling voor ongewenste kinderloosheid brengt onbedoeld vaak spanningen en ongemak met zich mee. Bespreek uw gevoelens en vragen met de gynaecoloog of fertiliteitsverpleegkundige en aarzel niet om erover te praten met elkaar, met familie of vrienden. Ook contact met lotgenoten kan helpen.

## Nuttige adressen

*Patiëntenvereniging voor paren met vruchtbaarheidsproblemen:*

Freya

Postbus 476

6600 AL Wijchen

tel. (024) 645 10 88

[www.freya.nl](http://www.freya.nl)

Fertiliteitsafdeling Isala klinieken Zwolle

Dr. Spanjaardweg 29, gebouw B, tweede etage

8025 BT Zwolle

Secretariaat Fertiliteitsafdeling

t (038) 424 52 24, b.g.g. (038) 424 50 00

f (038) 424 76 46

bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur

[www.isala.nl](http://www.isala.nl)