

Behandeling van spataderen met de closure procedure

| | |
|---|---|
| Wat zijn spataderen? | 2 |
| Hoe kunnen spataderen worden behandeld? | 2 |
| De closure procedure (VNUS) | 2 |
| Vorbereiding | 3 |
| Uitvoering van de behandeling | 3 |
| Nazorg en controle | 4 |
| Zijn er bijwerkingen? | 5 |
| Vragen? | 5 |

Wat zijn spataderen?

Het hart pompt zuurstofrijk bloed via de slagaderen naar alle lichaamsdelen. Via de aderen wordt het zuurstofarme bloed weer terug gevoerd naar het hart. Om te voorkomen dat het bloed naar beneden gaat als u rechtop staat, zitten er kleppen in de aderen. Deze maken alleen een bloedstroom naar het hart mogelijk (eenrichtingsverkeer). Door familiale aanleg voor spataderen, tijdens de zwangerschap en als u veel staat, kunnen de aderen in de benen verslappen en de kleppen gaan lekken. Men spreekt dan van spataderen (varices). Deze spataderen kunnen aan de buitenkant zichtbaar zijn, maar ook `van binnen` zitten. Ze kunnen klachten geven van vermoeidheid, pijn, een zwaar gevoel en vochtophoping in de benen. Ook kunnen ze cosmetisch ontsierend zijn en kan een pijnlijke spataderontsteking ontstaan.

2

Hoe kunnen spataderen worden behandeld?

Spataderen kunnen worden behandeld door een operatie, sclerocompressietherapie, foam echo-sclerose, Muller-tecniek (ambulante flebectomie) en de closurebehandeling (VNUS). Op advies van uw behandelend specialist wordt één of een combinatie van deze behandelingen bij u uitgevoerd. In deze folder wordt de closure procedure besproken.

De closure procedure (VNUS)

Als er grote spataderen zijn, die beginnen in de lies en/of knieholte, dan komt u in aanmerking voor de closure procedure. De closure procedure vervangt een operatieve ingreep op de operatiekamer. Bij deze behandeling wordt een katheter in de spatader geschoven. De katheter geeft warmte af waardoor de spatader verschrompelt en zich sluit.

De behandeling zelf duurt ongeveer 35 minuten. Na de behandeling krijgt u nog een prikje tegen trombose.

Vorbereiding

- Het desinfectiemiddel dat gebruikt wordt, kan vlekken veroorzaken in uw ondergoed. Het is daarom verstandig een oude of zwarte onderbroek te dragen zonder pijpjes
- Kom niet lopend of op de fiets naar het ziekenhuis. Het is verstandig na de behandeling niet zelf naar huis te rijden
- We vragen u om 10 minuten voor het geplande tijdstip van de behandeling aanwezig te zijn

Uitvoering van de behandeling

De closure procedure vindt poliklinisch plaats en duurt ongeveer 35 minuten. U neemt plaats op de behandelbank. Uw been wordt gedesinfecteerd. Hierna wordt het been afgedekt met steriele doeken. De arts prikt de spatader aan. Dit aanprikken kan gevoelig zijn. Hierna wordt plaatselijk verdoofd en wordt een katheter in de spatader gebracht. Met een echoapparaat wordt de juiste positie van de katheter gecontroleerd. Hierna wordt het gebied rondom de katheter plaatselijk verdoofd door middel van injecties in het bovenbeen. Ook dit kan gevoelig zijn. De katheter is hierna klaar om radiofrequente energie af te geven (dit geeft warmte) zodat de spatader zal verschrompelen en zich zal sluiten. Hier merkt u niets van.

Op een teken van de arts wordt de katheter verwarmd. Hierna wordt de katheter een klein stukje teruggetrokken en wordt het volgende stuk spatader behandeld. De katheter wordt steeds een stukje verder teruggetrokken totdat de hele spatader is behandeld.

Nazorg en controle

- Na de behandeling plaatst de assistente een hechtstrip, legt ze een drukverband aan en trekt een witte en bruine kous bij u aan (deze krijgt u op de poli). U krijgt een antitromboseprikje in de buik. Hierna mag u naar huis
- De witte kous en het drukverband moeten 48 uur dag en nachten blijven zitten. Tevens draagt u overdag de bruine kous (over de witte kous). Voor het slapen gaan, trekt u de kous uit en bij het opstaan trekt u de bruine kous weer aan
- Na 48 uur mag u de witte kous, het verband en de hechtstrip verwijderen. U dient dan alleen de bruine kous overdag door te dragen gedurende twee weken
- Wanneer u thuiskomt mag u paracetamol innemen tegen eventuele napijn
- De eerste twee weken na de behandeling mag u niet zwaar tillen, springen en hardlopen/beensporten doen
- Zwemmen, saunabezoek en baden raden we eveneens af de eerste twee weken
- Vaak wordt na de VNUS behandeling een aanvullende spataderbehandeling zoals sclerocompressietherapie of de Mullertechniek toegepast

Zijn er bijwerkingen?

Na een VNUS behandeling hebben de meeste mensen weinig tot geen pijn. Er kan wat bloederig vocht in de kous lekken, dit is normaal. Soms ontstaan harde knobbels of strengen in het behandelde gebied. Deze verdwijnen vanzelf na enkele weken. Het (langer) dragen van de bruine steunkous kan hierbij helpen. Ook kan tijdelijk een doof gevoel ontstaan in het behandelde gebied. Dit verdwijnt in de meeste gevallen na twee tot twaalf weken.

Mocht u klachten krijgen van bijvoorbeeld zwelling van het been, pijn in de kuit of benauwdheid, dan moet u altijd contact met de polikliniek opnemen omdat door de behandeling in zeer zeldzame gevallen een ader dicht kan gaan zitten (trombose). Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp van Nij Smellinghe.

Bij een nabloeding drukt u de plek minstens 20 minuten af met een droge doek, en neemt u contact op met poli dermatologie of na kantooruren de spoedeisende hulp.

Vragen?

Verdere vragen kunt u stellen aan uw behandelend arts. polikliniek Dermatologie, telefoonnummer 0512 588 801, keuze drie, op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.