

Voorlichting en gebruiksaanw. Nitrospray & Isordil

Inleiding	2
Wanneer kunt u dit medicijn innemen?	2
Werking	2
Hoe gebruikt u dit medicijn?	2
Als de pijn niet verdwijnt	2
Voorzorgsmaatregelen	3
Bijwerkingen	3
Nog even dit ...	3
In het kort:	3

Inleiding

Voor uw klachten heeft de arts Nitrospray of Isordil voorgeschreven. In deze voorlichtingsfolder leest u meer informatie over deze medicijnen.

Wanneer kunt u dit medicijn innemen?

Als u pijn of een beklemmend gevoel op de borst heeft, kunt u Nitrospray of Isordil nemen. Pijn op de borst, ook wel angina pectoris genoemd, kan soms uitstralen naar de kaken, linkerarm, rug of schouderbladen. De pijn ontstaat door verminderde doorbloeding van de kransslagaderen.

Werking

Nitrospray en Isordil verwijden de bloedvaten. Hierdoor krijgt de hartspier meer bloed en dus meer zuurstof. Daardoor kunnen uw klachten afnemen. De nitroglycerine die in deze tabletten of spray zit, wordt via het mondslijmvlies opgenomen in de bloedbaan.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Bij klachten neemt u een Nitrospray of een tablet Isordil onder de tong en laat deze smelten. Het effect moet binnen enkele minuten optreden. De werking kan 30 minuten tot een uur aanhouden. Wanneer een tablet of de spray na 5 tot 10 minuten niet heeft geholpen, mag u nogmaals een tablet of spray nemen. Dit mag u bij aanhoudende klachten maximaal twee keer herhalen, tot u in totaal drie keer hebt gebruikt.

Als de pijn niet verdwijnt

Als u driemaal een tablet Isordil of driemaal een Nitrospray heeft genomen en u blijft pijn op de borst houden, neem dan contact op met de huisarts.

Vermeld dan dat u klachten heeft en al driemaal een tabletje of spray hebt genomen.

Voorzorgsmaatregelen

Als u een aanval van pijn op de borst heeft, ga dan rustig zitten of ga op bed liggen en neem een tablet of spray onder de tong. Heeft u regelmatig pijn op de borst en u weet van tevoren wanneer deze aanvallen zich voordoen? Neem dan een tablet of spray vooraf, dus voordat u pijn op de borst krijgt.

Bijwerkingen

Door het vaatverwijdend effect van deze medicijnen kunnen hoofdpijn, hartkloppingen of duizeligheid optreden. Wanneer u na de eerste inname duizelig wordt, neem dan niet nogmaals een tablet of spray in. Als de pijn op de borst blijft, bel dan de huisarts.

Nog even dit ...

- De tabletten en de spray moeten droog en donker bewaard worden.
- Let op de vervaldatum. Na deze datum neemt de werking duidelijk af.
- Meld regelmatig gebruik van Nitrospray/ Isordil aan uw huisarts of cardioloog bij controle op de polikliniek.
- Zorg ervoor dat u de medicijnen altijd bij u heeft en indien nodig direct kunt innemen.
- Bij vragen kunt u contact opnemen met uw huisarts of cardioloog.

In het kort:

Wat te doen bij pijn op de borst:

- Activiteiten staken
- Rustig gaan zitten of liggen
- Isordil of Nitrospray onder de tong laten smelten en 5 – 10 minuten rustig afwachten

Als de pijn niet weggaat en u bent niet duizelig

Nogmaals Isordil of Nitrospray onder de tong, 5 – 10 minuten rustig afwachten

Als de pijn niet weggaat of tussentijds erger wordt

Bel dan de huisarts of bij zeer ernstige klachten met 112.