

Jodiummarker inbrengen voor de operatie van een niet voelbare afwijking bij borstkanker

Doel van het onderzoek	2
Vorbereiding	2
Kleding	2
Verloop van het onderzoek	3
Verloop tijdens de operatie	4
De uitslag	4
Tenslotte	4

Doel van het onderzoek

Bij een eerdere mammografie is bij u een afwijking in de borst gezien die verwijderd moet worden. Meestal is in een eerder stadium al een biopsie verricht.

De afwijking in uw borst is niet goed te voelen. Om het juiste gebied operatief te verwijderen is het daarom nodig om een marker in de afwijkende plek in uw borst te plaatsen. Deze marker is een klein metalen cilindertje met een dun laagje radioactief materiaal. De hoeveelheid radioactiviteit is maar heel gering en kan daardoor geen kwaad. De marker wordt ingebracht in uw borst. De marker kan door de radioactiviteit opgespoord worden door de chirurg en zo kan de chirurg het juiste gebied in uw borst verwijderen. Het plaatsen van de marker gebeurt met echografie of met röntgenopnames.

2

Vorbereiding

Voor het onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Let op: Gebruik op de dag van de afspraak geen bodylotion of talkpoeder op het bovenlichaam.

Kleding

U kunt uw normale kleding dragen. Voor het onderzoek zal de MBB'er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige) u vragen uw bovenlichaam te ontkleden.

Verloop van het onderzoek

Röntgen

Het onderzoek vindt plaats met behulp van het mammografie-apparaat. Afhankelijk van langs welke kant de jodiummarker geplaatst moet worden, kan u voor het apparaat komen te zitten, of liggen op de zij. Uw borst wordt het hele onderzoek aangedrukt door een compressieplaat, net zoals bij een mammogram, maar deze plaat bevat een rechthoekige opening. De afwijking in uw borst moet precies in het midden van deze rechthoekige opening worden afgebeeld. Daarna is het van belang om niet meer te bewegen.

Er wordt een aantal foto's gemaakt. De computer kan met behulp van deze foto's nauwkeurig de plaats en de diepte berekenen waar de marker moet worden ingebracht. De huid wordt gedesinfecteerd. De plaats waar de marker wordt ingebracht wordt verdoofd.

3

Nadat de verdoving is ingewerkt wordt de marker ingebracht. Aansluitend worden er twee controlefoto's gemaakt. Op de monitor kan direct worden bekeken of de marker in de afwijking zit. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Echo

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een onderzoekstafel. De radioloog brengt met behulp van het echoapparaat het afwijkende gebied in beeld. De huid wordt gedesinfecteerd en de plek waar de marker wordt ingebracht wordt verdoofd. Nadat de verdoving is ingewerkt wordt de marker, precies in het afwijkende gebied geplaatst. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Zowel na röntgen als echo geldt

Ter controle worden vervolgens nog twee mammografieopnames gemaakt van uw borst. Daarna mag u zich aankleden, u kunt gewoon een bh dragen.

Verloop tijdens de operatie

Tijdens de operatie wordt de marker opgespoord met een apparaat dat radioactiviteit detecteert. Het weefsel rond de marker wordt verwijderd. Van het verwijderde weefsel wordt een röntgenfoto gemaakt om te beoordelen of de afwijking in het stukje weefsel zit. Vervolgens wordt het weefsel opgestuurd naar het laboratorium voor onderzoek.

De uitslag

Na ongeveer zeven dagen krijgt u de uitslag van uw behandelend chirurg. Aan de hand van de uitslag wordt het verdere beleid bepaald.

Tenslotte

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u ze stellen voor aanvang van het onderzoek of u kunt telefonisch contact opnemen met de mammacareverpleegkundige, tel. 0512 588 521.