

# Belangrijke informatie over thiamazol, PTU of carbimazol

U heeft een te snel werkende schildklier. Uw internist heeft geadviseerd om te starten met thiamazol (strumazol), PTU (propylthiouracil) of carbimazol.

## Bijwerkingen

Deze medicijnen kunnen bijwerkingen geven. Veel voorkomende bijwerkingen zijn jeuk en huiduitslag. Meestal gaat dit na enkele dagen tot weken over. Als het blijft, kunt u contact opnemen met de internist.

Ook gewrichtsklachten kunnen een bijwerking zijn. Is het hinderlijk, bespreek het dan met uw internist.

## Ernstige maar zeldzame bijwerking

De genoemde medicijnen kunnen ook leiden tot een verlaging van de witte bloedcellen. Witte bloedcellen zijn belangrijk voor de afweer tegen infecties. Deze bijwerking komt bij minder dan 1 op de 1000 mensen voor. De bijwerking kan plotseling ontstaan. Regelmatig bloedonderzoek op witte bloedcellen is niet zinvol.

Het is een zeldzame bijwerking maar het kan wel ernstig zijn.

Als u keelpijn heeft of een temperatuur boven de 38,5 dan moet u die dag contact opnemen met uw behandelend internist. Mogelijk heeft u dan deze zeldzame bijwerking. Er zal dan bloedonderzoek verricht worden. U mag de medicatie tijdelijk staken tot de uitslag bekend is.

## Bereikbaarheid

U kunt overleggen met de polikliniek Interne Geneeskunde, telefonisch te bereiken via (0512) 58 8877 van 8:00 uur tot 16:30 uur. Als u buiten kantooruren wilt overleggen, kan dit via de dokterswacht.