

In de eerste levensjaren doet een kind ervaring op met het eten en drinken van verschillende soorten voedsel. Soms gaat dit niet vanzelf, of moeilijk. Er kan sprake zijn van een medisch probleem of een negatieve ervaring waardoor het eten en drinken wordt beïnvloed. Soms wordt het niet duidelijk waarom een kind moeite heeft met eten en drinken. Dit kan veel stress opleveren bij zowel het kind als de ouder.

Een logopedist kan de volgende logopedische problemen onderzoeken, adviseren en behandelen:

## De baby:

- Heeft moeite met drinken uit de borst en/of fles
- Heeft moeite met de coördinatie tussen ademen, zuigen en slikken
- Verslikt zich
- Spuugt veel tijdens of na de voeding
- Weigert de fles

## Het kind:

- Heeft moeite met het afhappen van de lepel
- Heeft moeite met kauwen
- Heeft moeite met drinken uit de (tuit)beker
- Heeft moeite met of weigert bijvoeding en/of vaste voeding
- Spuugt vaak eten of drinken uit
- Heeft moeite met slikken
- Verslikt zich
- Heeft geen controle over speeksel

Tevens kan de logopedist adviseren bij het afbouwen van sondevoeding.

## Onderzoek en behandeling

Het logopedisch onderzoek en de behandeling ziet er als volgt uit. De logopedist komt vlak voor een voedingsmoment bij u en uw kind. Ze stelt gerichte vragen om meer inzicht te krijgen in het probleem. Aansluitend doet ze onderzoek en observeert ze uw kind tijdens het voedingsmoment. Nadien wordt deze observatie met u besproken. Vaak krijgt u al de eerste adviezen. De logopedische behandeldoelen voor uw kind worden samen met u opgesteld waarbij we nauw samenwerken met de verpleging, de arts en andere disciplines. Tussentijds wordt dit geëvalueerd.