

# Instructies na een tandheelkundige behandeling met Midazolam

Uw kind is tandheelkundig behandeld met Midazolam met lokale verdoving.

Thuis moet u uw kind de eerste uren voortdurend in de gaten houden, totdat uw kind weer helemaal wakker is. De eerste uren kan uw kind nog slaperig, hangerig of duizelig zijn. Let hierbij op: verminderde sufheid, goede huidskleur en ademhaling.

Laat uw kind niet alleen de trap op lopen, op de trampoline springen of op dingen klimmen/zitten waar het van af kan vallen zoals een fietsje of schommel. Zodra de verdoving is uitgewerkt, mag uw kind gewoon weer eten en drinken. Misselijkheid komt zelden voor.

Pijn na vullen of het trekken van een tand of kies komt zelfden voor maar indien nodig kunt u paracetamol geven.

De juiste dosering voor paracetamol is:

1-2 jaar: 4-6 keer per dag 120 mg

2-4 jaar: 4-6 keer per dag 120 -180 mg

4-6 jaar: 4-6 keer per dag 180 mg

6-9 jaar: 4-6 keer per dag 240-250 mg

Indien er hechtingen gebruikt zijn dan verwijderen deze na enkele dagen vanzelf. Het is niet erg als de hechtingen er 's avonds al uit gaan.

Als er roestvrijstalen kroontjes geplaatst zijn kan dit wat langer een ongemakkelijk gevoel geven. 2-3 dagen is normaal.

Met vriendelijke groet,  
Team Centrum Bijzondere Tandheelkunde