

Suprapubische Katheter

Vragen voor het onderzoek	2
Vorbereiding	2
De ingreep	3
Complicaties van de ingreep	3
Verwisselen van de katheter	3
Complicaties	4
Neem contact op met de polikliniek Urologie als	4
Contact	5

Vragen voor het onderzoek

Omdat u een ingreep ondergaat, moet u de volgende vragen over de MRSA/BMRO bacterie beantwoorden. Beantwoordt u een van deze vragen met ja, neem dan contact op met het secretariaat:

- Bent u drager van MRSA/BMRO?
- Bent u de afgelopen 2 maanden opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis of zorginstelling?
- Heeft u de afgelopen 2 maanden verbleven in een zorginstelling met een MRSA/BMRO probleem of onbeschermd contact gehad met een MRSA positieve patiënt?
- Heeft u contact gehad met levende mestvarkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden?
- Verbleef u de afgelopen 2 maanden als migrant/vluchteling > 2 maanden in een gezamenlijke woonvorm of opvang?

2

In overleg met uw arts heeft u besloten een suprapubische katheter in te laten brengen. Het doel van deze katheter is om te zorgen dat de urine uit de blaas naar buiten wordt afgevoerd.

Vorbereiding

De ingreep gebeurt onder steriele omstandigheden om infectie te voorkomen. Voor de ingreep wordt de buikwand geschoren, boven het schaambeentje. U hoeft voor de ingreep niet nuchter te zijn. Wanneer u bloedverdunners gebruikt, dan moet u deze medicatie waarschijnlijk een aantal dagen voor de ingreep stoppen. De behandelend arts bespreekt dit met u.

De ingreep

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de balie van de polikliniek urologie en neemt plaats in de wachtkamer. U wordt opgeroepen door de verpleegkundige die u meeneemt naar een onderzoekkamer. U neemt plaats op een behandeltafel. Er wordt eventueel eerst een blaaskatheter ingebracht om de blaas te vullen. Na desinfectie van de buikwandhuid wordt de huid verdoofd middels een injectie (plaatselijke verdoving). De arts maakt ter plaatse van de verdoofde huid een klein sneetje van 1 cm. Hierna wordt met een dikkere naald de blaas aangeprikt. Dit kan een pijnlijke gevoel geven. Vervolgens wordt een katheter geplaatst. De ingreep duurt ca. 10 minuten.

Complicaties van de ingreep

- Bloedverlies uit de blaas door de punctie
- Schade aan de omliggende weefsels zoals een bloedvat of darmlijs. Het risico wordt kleiner als de blaas goed gevuld kan worden voor de punctie. Bij twijfel kan eventueel met een echografie de blaas gelokaliseerd worden .

Bovengenoemde complicaties zijn uiterst zeldzaam.

Omggaan met de katheter

Dagelijks moet de insteekopening van de katheter afgedekt worden met een gaas (splitgaas), eventueel betadine jodiumzalf op het gaas aanbrengen. Op de katheter kan een urinezak worden aangesloten. Verder informatie vindt u in de folder 'thuis met uw katheter'.

Verwisselen van de katheter

De eerste twee wissels vinden plaats op de polikliniek met tussen pozen van ongeveer zes weken. De dikte van de katheter neemt dan twee keer iets toe. De vervolgwissels vinden daarna plaats in de thuissituatie door een verpleegkundige van de thuiszorg of bij de huisarts.

Afhankelijk van de soort katheter gebeurt deze wissel tussen de 8 en 12 weken. Meteen nadat de oude katheter is verwijderd, moet de nieuwe worden ingebracht omdat het insteekkanaal vrij snel (binnen enkele uren) kan sluiten. Als er veel steenaanslag op de katheterpunt zit, kan de volgende wissel wat vervroegd worden.

Advies voor wanneer de katheter wissel moeizaam gaat: is het gebruik een Integraal katheter CH18. Deze katheter heeft een geïntegreerde ballon waardoor bij wisselen de ballon netjes terug vouwt en er minder richels/randen ontstaan bij het invouwen van de ballon. Deze katheters zijn te bestellen via een apotheek of een medisch speciaalzaak.

Complicaties

1. Blaaskrampen: er wordt dan urine geperst naast de katheter. Dit kan ook het gevolg zijn van een infectie
2. Verstopping van de katheter: deze moet dan gespoeld worden en zonodig verwisseld
3. Uitvallen van de katheter: wanneer de katheter is uitgevallen moet er zo snel mogelijk een nieuwe katheter ingebracht worden, voordat het gaatje zich gesloten heeft (dit kan heel snel gaan)

Neem contact op met de polikliniek Urologie als

- De katheter eruit valt
- De katheter niet meer loopt
- U koorts krijgt en/of pijn in de flank
- Indien er pus uit de insteekopening van de katheter komt

Contact

Heeft u vragen? Stel ze in de BeterDichtbij app.

Kan het niet wachten? Bel dan naar de polikliniek Urologie

Telefoonnummer 0512 588 811